

- [クリッピング採用薬]や[先発・後発]などにチェックを付けた場合、() にその条件で絞り込んだ件数を表示します。

相互作用マトリックス

[ヘルプ](#)

代表品 代表品 代表品以外

クリッピング採用薬 院内採用薬 院外採用薬

先発・後発品 先発(先発品 準先発品) 後発品 先発・後発品以外

検索対象 検索対象に一般名を含める

No.	医薬品名	医薬品数	番号	[1]	[2]	[3]	[4]	検索した医薬品の相互作用情報	
								併用禁忌	併用注意
1	クラリシッド	3 (1)	[1]		3 (1)	3 (1)	3 (1)	29 (1)	3,582 (9)
2	アダラート	7 (5)	[2]					2 (0)	4,496 (7)
3	クリアミン	2 (1)	[3]	2 (1)				226 (1)	3,562 (2)
4	トリアゾラム	18 (1)	[4]	18 (1)				91 (0)	4,042 (2)

クリッピング採用薬にチェックを付けます。

相互作用がある医薬品数と () の採用薬に絞り込んだ医薬品数

【相互作用簡易理由画面】

相互作用検索結果一覧

入力した医薬品名 [1]クラリシッド × [2]アダラート **併用注意**

1件ヒットしました (1件目を表示) 50 件ごとに表示

先発○ 同薬効の後発品がある先発品 準先発 準先発 先発品 同薬効の後発品がない先発品 後発品 後発品 ★ 後発品除外品目

簡易表示 詳細表示 閉じる

No.	先後発	医薬品名	一般名	規格単位	会社名	簡易理由
1	先発○	クラリシッド錠 200mg	クラリスロマイシン錠	200mg1錠	マイランEPD	カルシウム拮抗剤 (CYP3A4で代謝される薬剤) の血中濃度上昇に伴う作用の増強等の可能性

どの医薬品との相互作用が表示します。

入力した医薬品名から見た相互作用の簡易理由を表示します。

【相互作用詳細理由画面】

相互作用検索結果一覧

入力した医薬品名 [1]クラリシッド × [2]アダラート **併用注意**

1件ヒットしました (1件目を表示) 50 件ごとに表示

先発○ 同薬効の後発品がある先発品 準先発 準先発 先発品 同薬効の後発品がない先発品 後発品 後発品 ★ 後発品除外品目

簡易表示 詳細表示 閉じる

No.	先後発	医薬品名	一般名	詳細理由
1	先発○	クラリシッド錠200mg	クラリスロマイシン錠	クラリスロマイシンとカルシウム拮抗剤 (CYP3A4で代謝される薬剤) との併用により、カルシウム拮抗剤 (CYP3A4で代謝される薬剤) の血中濃度上昇に伴う作用の増強等の可能性があるため、異常が認められた場合には、投与量の調節や中止等の適切な処置を行うこと。クラリスロマイシンのCYP3A4に対する阻害作用により、カルシウム拮抗剤 (CYP3A4で代謝される薬剤) の代謝が阻害される。

どの医薬品との相互作用が表示します。

入力した医薬品名から見た相互作用の詳細理由を表示します。

先発・後発について（厚生労働省「使用薬剤の薬価（薬価基準）に収載されている医薬品について」に準拠しています。）

先発○	後発品がある先発品
先発品	後発品がない先発品
準先発	昭和 42 年以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、価格差のある後発医薬品があるものについては、「準先発品」として、先発品に準じた扱いとしています（内用薬及び外用薬に限る。）
後発品	後発品
★	後発品除外品目（後発医薬品として承認された医薬品であっても、先発医薬品と同額又は薬価が高い後発品であり、診療報酬における加算等の算定対象外）
空白	先発・後発でない医薬品（昭和 42 年以前に承認・薬価収載された医薬品や局方品、漢方製剤など）

【検索した医薬品の相互差表情報】



「検索した医薬品の相互差表情報」は、すべての医薬品から見た入力した医薬品名との相互作用がある医薬品数です。検索した医薬品の相互差表情報の数字をクリックすると「薬効別結果一覧」画面が表示します。薬効別の相互作用の把握ができます。

相互作用検索薬効別結果一覧		
入力した医薬品名 [1]クラリシッド 併用禁忌 : 29件ヒットしました		
1149	中枢神経系用薬 / 解熱鎮痛消炎剤 / その他	2
1179	中枢神経系用薬 / 精神神経用剤 / その他	7
1190	中枢神経系用薬 / その他の中枢神経系用薬 / その他	3
2189	循環器官用薬 / 高脂血症用剤 / その他	3

相互作用検索結果一覧							
入力した医薬品名 [1]クラリシッド 併用禁忌 薬効分類 [1179]中枢神経系用薬 / 精神神経用剤 / その他							
7件ヒットしました (1 ~ 7件目を表示) 50 件ごとに表示							
<input type="checkbox"/> 先発○ <input type="checkbox"/> 同薬効の後発品がある先発品 <input type="checkbox"/> 準先発 <input type="checkbox"/> 先発品 <input type="checkbox"/> 同薬効の後発品がない先発品 <input type="checkbox"/> 後発品 <input checked="" type="checkbox"/> 後発品除外品目							
簡易表示		詳細表示			閉じる		
				➡ : 入力した医薬品からみた相互作用 ⇐ : 入力した医薬品以外からみた相互作用			
No.	先後発	医薬品名	一般名	規格単位	会社名	方向	簡易理由
1	先発品	オーラップ細粒1%	ピモジド細粒	1%1g	アステラス	➡	ピモジドの血中濃度が上昇、QT延長、心室性不整脈（Torsades de pointesを含む）等の心血管系副作用が報告
						⇐	QT間隔延長、心室性不整脈等の重篤な副作用を起こすおそれ
2	先発品	オーラップ錠1mg	ピモジド錠	1mg1錠	アステラス	➡	ピモジドの血中濃度が上昇、QT延長、心室性不整脈（Torsades de pointesを含む）等の心血管系副作用が報告
						⇐	QT間隔延長、心室性不整脈等の重篤な副作用を起こすおそれ
3	先発品	オーラップ錠3mg	ピモジド錠	3mg1錠	アステラス	➡	ピモジドの血中濃度が上昇、QT延長、心室性不整脈（Torsades de pointesを含む）等の心血管系副作用が報告
						⇐	QT間隔延長、心室性不整脈等の重篤な副作用を起こすおそれ
4	先発品	バルネチール細粒50%	スルトブリド塩酸塩細粒	50%1g	共和薬品	⇐	QT間隔延長、心室性不整脈等の重篤な副作用を起こすおそれ

どの医薬品からみた相互作用の理由を矢印で表します。
 ➡ 入力した医薬品からみた相互作用
 ⇐ 入力した医薬品以外から見た相互作用

相互作用の理由を表示します。
 (簡易理由・詳細理由)

■データ提供

- ・ 相互作用データ：株式会社湯山製作所