


## 錠剤等の識別コードを調べたい

持参薬を識別コード等から検索できます。

メインメニューから「薬剤識別コード検索」を選びます。



次に検索画面を表示します。

下図の例では

- (1) 検索画面で「識別コード（本体）」に入力。
- (2) 「検索条件を追加」をクリックします。

薬剤識別コード検索

ヘルプ

識別コード（本体）

識別コード（包装）

マーク  参照 クリア

剤形  参照

色

本体識別コード

割線

医薬品名   入力補助機能を使用する

一般名  逆方参照

会社名

クリッピング採用薬  採用薬

**検索条件を追加** クリア

識別コード	マーク	剤形	色	医薬品名	一般名	会社名	本体識別	割線	採用薬
検索条件は登録されていません。									

検索 全条件を削除 選択中の医薬品をクリア

- (1) 検索条件が追加されます。複数の医薬品を調べる場合は、上記の(1)、(2)を繰り返して検索条件を追加します。
- (2) 「検索」をクリックします。

錠剤識別コード検索

ヘルプ

識別コード (本体)

識別コード (包装)

マーク  参照

剤形  参照

色

本体識別コード  ▼

割線  ▼

医薬品名   入力補助機能を使用する

一般名  運方参照

会社名

クリッピング採用薬  採用薬

(1) 検索条件が追加されます

識別コード	マーク	剤形	色	医薬品名	一般名	会社名	本体識別	割線	採用薬
条件1	本体 : 248								<input type="button" value="削除"/>

※条件リンクをクリックすると検索条件を修正できます

(2) 検索をクリック

- (1) 医薬品名をクリックすると、錠剤や包装の画像や識別コード、効能・効果、用法・用量等を確認できます。
- (2) 検索条件に該当する医薬品の一覧を表示します。ここで識別コード等を確認できます。
- (3) 検索した医薬品の同成分・同区分・同剤形・同規格・同薬効を確認できます。

薬剤識別コード検索結果一覧									
条件1									
識別コード	マーク	剤形	色	医薬品名	一般名	会社名	本体識別	割線	採用薬
6件ヒットしました (1 ~ 6件目を表示) 50 件ごとに表示									
追加	先発○ 探	アリセプトD錠5mg トネベシル塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg1錠(PTP14錠)	エーザイ 本体: E-248 5 包装: E-248		アリセプト-D錠5mg	エーザイ	E-248 5		採用薬
追加	後発品 探	アロプリノール錠100mg「サワイ」 アロプリノール100mg錠 100mg1錠(PTP10錠)	沢井製薬 本体: SW-248 包装: SW-248		アロプリノール錠100mg	沢井製薬	SW-248		
追加	後発品	オキシブチオン塩酸塩錠1mg「デバ」 オキシブチオン塩酸塩錠1mg錠 1mg1錠(PTP10錠)	武田薬品工業 本体: T-248 包装: TYK248		オキシブチオン塩酸塩錠1mg	武田薬品工業	T-248		

(1) 医薬品名をクリック

(2) 識別コード等が確認できます

薬剤識別コード検索詳細										
持参薬鑑別報告書作成										
医薬品名	アリセプトD錠5mg			追加	添付文書	先発・後発品	先発○ (後発品がある先発品)			
一般名	トネベシル塩酸塩口腔内崩壊錠					適応症の違い	なし			
規格単位	5mg1錠					生物由来				
会社名	エーザイ					投与期間制限				
薬価	125.40					新医薬品解除予定月				
採用薬	採用薬					解除後制限				
投与区分	内用					薬価収載日	2004/06/25			
規制区分	承認					経過措置満了日				
向精神薬分類						厚労省コード	1190012F4025			
代表品区分	代表品					YJコード	1190012F4025			
画像	 表 裏		 5mg		 表 裏		 5mg			
剤形の大きさ	長さ(直径・長径):8.0mm,厚さ:3.3mm,重量・質量:168mg ※2022/11の添付文書より									
識別コード(本体)	E-248 5					旧コード(本体)	E-248:5			
識別コード(包装)	E-248					旧コード(包装)	-			
色	白			剤形	口腔内崩壊錠		割線	無		
主な拡張薬効分類	コリンエステラーゼ阻害薬-内用(ヒペリジン系) アルツハイマー型認知症改善薬-内用(コリンエステラーゼ阻害薬)									
効能・効果	アルツハイマー型認知症及びレビー小体型認知症における認知症状の進行抑制									
用法・用量	<アルツハイマー型認知症における認知症状の進行抑制> 通常、成人にはトネベシル塩酸塩として1日1回3mgから開始し、1~2週間後に5mgに増量し、経口投与する。高度のアルツハイマー型認知症患者には、5mgで4週間以上経過後、10mgに増量する。なお、症状により適宜減量する。 <レビー小体型認知症における認知症状の進行抑制> 通常、成人にはトネベシル塩酸塩として1日1回3mgから開始し、1~2週間後に5mgに増量し、経口投与する。5mgで4週間以上経過後、10mgに増量する。なお、症状により5mgまで減量できる。 投与開始12週間後までを目安に、認知機能検査、患者及び家族・介護者から自他覚症状の聴取等による有効性評価を行い、認知機能、精神症状・行動障害、日常生活動作等を総合的に評価してベネフィットがリスクを上回ると判断できない場合は、投与を中止すること。また、投与継続の可否を判断すること。									
	<input checked="" type="checkbox"/> 同成分 <input type="checkbox"/> 同区分 <input type="checkbox"/> 同剤形 <input type="checkbox"/> 同規格 <input type="checkbox"/> 同薬効									
探	医薬品名	規格単位	薬価	会社名	一般名	後発品	薬効	添付文書	追加	
探	アリセプト細粒0.5%	0.5%1g	123.40	エーザイ	トネベシル塩酸塩細粒	先発○	薬効	添付文書	追加	
探	トネベシル塩酸塩細粒0.5%「アメル」	0.5%1g	58.50	共和薬品	トネベシル塩酸塩細粒	後発品	薬効	添付文書	追加	
探	トネベシル塩酸塩細粒0.5%「サワイ」	0.5%1g	50.80	沢井	トネベシル塩酸塩細粒	後発品	薬効	添付文書	追加	
探	トネベシル塩酸塩細粒0.5%「日医工」	0.5%1g	50.80	日医工	トネベシル塩酸塩細粒	後発品	薬効	添付文書	追加	
探	アリセプトドライシロップ1%	1%1g	303.00	エーザイ	トネベシル塩酸塩シロップ用	先発品	薬効	添付文書	追加	

(3) 同成分・同区分・同剤形・同規格・同薬効が確認できます

検索した医薬品の鑑別報告書を印刷できます。

- (1) 鑑別報告書を作成する医薬品の横にある「追加」をクリックします。
- (2) 「持参薬鑑別報告書作成」をクリックします。

◆一覧画面から作成する場合

薬剤識別コード検索結果一覧

条件1 持参薬鑑別報告書作成 選択中の医薬品をクリア 検索画面に戻る

識別コード	マーク	剤形	色	医薬品名	一般名	会社名	本体識別	割線	採用薬	
本体：248										
6件ヒットしました（1～6件目を表示） <span>50</span> 件ごとに表示 <span>先発○ 同薬物の後発品がある先</span>										
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">追加</span>	先発○ 採用薬	アリセプトD錠5mg ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg1錠(PTP14錠)		エーザイ 本体：E 248 5 包装：E E 248						
	後発品	アロプリノール錠100mg「サワイ」		沢井製薬						

(2) 「持参薬鑑別報告書作成」をクリック

(1) 作成する医薬品を「追加」します

◆詳細画面から作成する場合

薬剤識別コード検索詳細

持参薬鑑別報告書作成

医薬品名	アリセプトD錠5mg	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">追加</span>	添付文書	先発・後発品	先発○（後発品がある先発品）	
一般名	ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠			適応症の違い	なし	
規格単位	5mg1錠			生物由来		
会社名	エーザイ			投与期間制限		
薬価	125.40			新医薬品解除予定月		
採用薬	採用薬			解除後制限		
投与区分	内用			薬価収載日	2004/06/25	
規制区分	劇処			経過措置満了日		
向精神薬分類				厚労省コード	1190012F4025	
代表品区分	代表品			YJコード	1190012F4025	
画像	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>本体</p> <p>表 裏</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>包装</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>旧本体</p> <p>表 裏</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>旧包装</p> </div> </div>					
剤形の大きさ	長さ（直径・長径）：8.0mm, 厚さ：3.3mm, 重量・質量：168mg ※2022/11の添付文書より					
識別コード（本体）	E 248 5			旧コード（本体）	E 248:5	
識別コード（包装）	E E 248			旧コード（包装）	-	
色	白		剤形	口腔内崩壊錠	割線	無



持参薬鑑別報告書印刷の画面になります。

(1) 「印刷画面」をクリックします。「簡易印刷」・「画像無し印刷」もできます。

※印刷から除外する医薬品がある場合は、「削除」をクリックします。

薬剤識別コード検索詳細

持参薬鑑別報告書

※簡易印刷：同成分・同薬効のノ規格【会社名】を表示しません  
※画像無し印刷：上記に加え、本体ノ包装画像を表示しません

◆アリセプトD錠5mg (5mg1錠) 探 先発 (後発有)

会社名 エーザイ  
一般名 ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠  
主な拡張薬効分類 コリンエステラーゼ阻害薬-内用(ピペリジン系)  
アルツハイマー型認知症改善薬-内用(コリンエステラーゼ阻害薬)

識別コード 本体 ⓔ248 5 旧本体 ⓔ248:5  
包装 ⓔ248

本体 ⓔ248 5 ⓔ248 5  
表 裏

包装 アリセプトD錠5mg

削除

(1) 「印刷画面へ」をクリックします  
簡易印刷・画像無しも選択可能です

※印刷しない場合は「削除」をクリック

持参薬鑑別報告書印刷のプレビュー画面になります。

(1) タイトルを変更できます。また変更したタイトルを初期にしたい場合、「タイトルを保存」をクリックします。(最大 20 文字)

(2) 患者さんの氏名や、鑑別報告書の作成日、担当者の氏名を入力できます。

(3) 服用間隔（朝/昼/夕/就寝前）や、服用の継続/中止のチェックを入力できます。

(4) 「印刷」をクリックすると「持参薬鑑別報告書」を印刷します。

タイトルを保存 印刷 閉じる

持参薬鑑別報告書

・患者氏名、担当者など入力することができます  
・服用間隔の「用法・用量」に用量を入力  
・持参薬鑑別報告書をPDFなどで保存し、持  
(注) 右端が印刷されない場合は、「ページ設定」で余白を変更してください。詳しくはヘルプをご覧ください。

患者氏名: 東京 太郎

作成日: 2023年06月26日  
担当者: 神田 花子

◆アリセプトD錠5mg (5mg1錠) 探 先発 (後発有)

会社名 エーザイ  
一般名 ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠  
主な拡張薬効分類 コリンエステラーゼ阻害薬-内用(ピペリジン系)  
アルツハイマー型認知症改善薬-内用(コリンエステラーゼ阻害薬)

識別コード 本体 ⓔ248 5 旧本体 ⓔ248:5  
包装 ⓔ248

本体 ⓔ248 5 ⓔ248 5  
表 裏

包装 アリセプトD錠5mg

起床	朝	1	昼	1	夕	1	就寝	持参数	<input type="checkbox"/> 継続	<input type="checkbox"/> 中止	<input type="checkbox"/> 変更
----	---	---	---	---	---	---	----	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

(1) タイトルを変更できます

(2) 患者さんの氏名や作成日、担当者を入力できます

(3) 服用間隔や服用の継続・中止を入力できます